

Dyrkningsvejledning

Hay Master



FORBEREDELSE AF SÅBED

Ukrudtspres	Vælg en mark med et lavt ukrudtspres, eller anvend et falsk såbed.
Jordstruktur	Løsn jorden i stor dybde, så rødderne kan vokse dybt.
Såbed	Etabler et fint og fast såbed.

SÅNING

Såperiode	Fra 1. april til 15. september. Vælg en periode med tilstrækkelig høj temperatur og tilstrækkelig fugtighed for at sikre en god spiring af græsfrøet.
Jordtemperatur	> 12 °C
Udsædsmængde ved såning	60 kg/ha
Udsædsmængde ved eftersåning	20-30 kg/ha, afhængigt af græssværdets tilstand.
Sådybde	0,5 - 1,5 cm. Anvend en Cambridge-tromle for at sikre god jordkontakt omkring frøet.
Rækkeafstand	Maksimalt 8 cm.

GØDSKNING

Periode	Gødsk tidligst muligt om foråret, så snart jordforholdene tillader det. Vær opmærksom på gældende lovgivning.
Gødningsmængde	Pr. gødningstildeling 15-25 ton/ha gylle eller 10 ton fast gødning suppleret med gennemsnitligt 75 kg rent kvælstof. Den præcise mængde kvælstof afhænger af jordkvaliteten og tidspunktet på året. Fast gødning kan kun anvendes i det tidlige forår. For at reducere risikoen for ormesmitte bør (egen) hestegødning komposteres, eller der bør gå mindst 1 år, før gødningen anvendes.
Supplerende gødskning	Svovl og kalium. Fastlæg mængden på baggrund af jord- og grovfoderanalysen.
Kalkning	Om efteråret for at optimere optagelsen af mineraler.

HØST

Vejrforhold	Høst i en tør periode. Det anbefales at have mindst 5 tørre og solrige dage.
Høsttidspunkt	Høst første slæt, så snart græsset begynder at skyde aks. Slå kun afgrøden, når jorden er tilstrækkeligt tør. Det afslåede græs kan herefter tørre ordentligt.
Høsttidspunkt	Omkring middagstid er det ideelle tidspunkt at slå græsset. Om morgenen er der stadig dug på afgrøden. Om eftermiddagen eller aftenen har afgrøden ikke længere mulighed for at tørre. Desuden stiger sukkerindholdet (fruktan) senere på dagen.
Vending	Vend det afslåede græs så ofte som muligt, men mindst 3 gange.
Udbytte	Høst ikke for store slæt af hensyn til tørretiden. Som retningslinje tages første slæt i maj-juni og andet og/eller tredje slæt i sommermånederne. En tommelfingerregel er, at afgrøden er mellem 30 og 50 cm høj. Efterhånden som afgrøden ældes, og væksten aftager, stiger indholdet af fruktan betydeligt. Tag højde for dette, hvis høet er beregnet til heste.
Rivning	Læg græsset i skår allerede om aftenen, inden ballerne presses. Dette forhindrer dug på afgrøden i løbet af den sidste nat. Indstil ikke riven for lavt. Derved undgås forurening af det afslåede græs.

ANBEFALINGER OG VEDLIGEHOLDELSE

Ukrudtsbekæmpelse	Forebyg ukrudt i græsmarken. Derved øges høudbyttet, afgrødens tørretid optimeres, og risikoen for, at giftige planter ender i høet, reduceres.
Eftersåning	Efterså i det tidlige forår eller om efteråret for at forlænge græssværdets levetid samt forbedre kvaliteten og udbyttet.